

ESAMI BATTERIOLOGICI

E' opportuno che il paziente non sia sottoposto a terapia antibiotica.

TAMPONE URETRALE

Si esegue su prenotazione. E' necessario evitare di urinare nelle 4-5 ore che precedono l'esame.

TAMPONE FARINGEO E TONSILLARE

Si esegue a digiuno e senza essersi lavati i denti a meno che non ci sia una sintomatologia clinica evidente (placche, febbre, mal di gola).

SPERMIOCOLTURA

Raccogliere il campione di liquido seminale a casa su un barattolo sterile ad imboccatura larga (es. quello per le urine – richiedere in laboratorio) avendo cura di non inquinare il liquido. Consegnare al punto prelievi al più presto.

ESAMI CITOLOGICI

CITOLOGIA URINARIA

Il campione d'urina che deve essere sottoposto ad esame citologico deve essere raccolto su apposito contenitore da richiedere al laboratorio, secondo le seguenti modalità:

1. Eiminare l'urina notturna;
2. Bere circa mezzo litro di acqua (non gassata) o the;
3. Raccogliere la prima minzione dopo la somministrazione di liquidi in contenitore dedicato per la raccolta di campioni urinari

E' opportuno svolgere questo esame per tre mattine successive. Conservare in frigorifero.

I campioni devono essere consegnati tutti e tre assieme.

ESAME CITOLOGICO DI ESPETTORATO

Il campione di espettorato deve pervenire al laboratorio nel più breve tempo possibile e raccolto secondo le seguenti modalità:

1. Risciacquare abbondantemente la bocca con acqua.
2. Somministrare al paziente, con controllo del medico curante, dei farmaci espettoranti.
3. Espettorare direttamente in contenitore sterile dedicato.

ALTRI ESAMI

SCOTCH TEST PER RICERCA OSSIIURI

Il laboratorio analisi fornisce all'utente i vetrini portaoggetti e le buste per la consegna. Tagliare con le forbici un pezzetto di scotch trasparente della lunghezza di 3-4 cm. Applicare in corrispondenza dello sfintere anale la mattina presto, senza aver lavato la parte. Togliere dopo pochi minuti. Applicare lo scotch per lungo su un vetrino portaoggetti con la parte che attacca aderente al vetrino.

Analisi Mediche



BM

BM Analisi Mediche S.r.l.

LABORATORIO PRIVATO
DI ANALISI CLINICHE

PREPARAZIONE AGLI
ESAMI

DIRETTORE RESPONSABILE
DR. ALFIERO MOLARI – BIOLOGO
SPECIALISTA IN BIOCHIMICA E CHIMICA CLINICA, MICROBIOLOGIA E
VIROLOGIA E SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE

VIA 24 MAGGIO, 23/1 – TEZZE SUL BRENTA (VI)

Tel.: 3273885138

E-mail: info@bmanalisimediche.it

www.bmanalisimediche.it

Rev. 1 del 01/08/2023

VALIDO PER TUTTI I PUNTI PRELIEVI



Aut. Comune di Tezze N° 13 del 21/08/2019

*Gentile cliente,
al fine di ottenere un buon risultato degli esami le
forniamo le seguenti informazioni. Non eseguiamo
prelievi a soggetti con età inferiore agli 8 anni.*

ESAMI DEL SANGUE

Presentarsi al laboratorio durante l'orario dei prelievi (informarsi presso i vari punti prelievo) a digiuno dalla mezzanotte. E' permesso bere acqua. La data di ritiro dei referti viene comunicata dagli addetti all'accettazione.

ESAMI DI COAGULAZIONE (PT, PTT, FIB)

Nei casi in cui sia in atto una terapia anticoagulante, il referto sarà consegnato, anche telefonicamente, dalle ore 14 dello stesso giorno dell'effettuazione del prelievo.

CURVA GLICEMICA

Il paziente deve presentarsi a digiuno per essere sottoposto ad un primo prelievo del sangue. Successivamente all'assunzione di una precisa quantità di zucchero, saranno effettuati altri 3 prelievi ad intervalli di 30'-60' l'uno dall'altro (0-30-60-120 minuti). L'esame non verrà eseguito se la glicemia di base risultasse > 150 mg/ml.

RENINA - ALDOSTERONE IN CLINO ED ORTOSTATISMO

La durata del prelievo è di circa due ore e mezza. Il paziente deve stendersi orizzontale su un lettino per

un'ora prima del prelievo in CLINOSTATISMO. Successivamente far rimanere il paziente in posizione eretta, senza farlo mai sedere, per almeno un'ora. Eseguire il secondo prelievo in ORTOSTATISMO.

PROVA IMMUNOLOGICA DI GRAVIDANZA

L'esame si esegue su un campione di urina, preferibilmente del mattino. Il metodo utilizzato consente una diagnosi attendibile non prima di 8-10 giorni dal presunto concepimento. Per una maggior sensibilità l'esame può essere eseguito sul sangue (HCG plasmatico).

ESAMI DELLE URINE

Il recipiente da utilizzare può essere ritirato in laboratorio o acquistato in farmacia.

ESAME URINE STANDARD

Per l'esame delle urine completo, raccogliere un campione delle urine preferibilmente del primo mattino e consegnarlo al più presto in laboratorio. E' consigliabile non eseguire l'esame durante il ciclo mestruale.

RACCOLTA URINE DELLE 24 ORE

Occorre munirsi di un contenitore della capienza di 2 litri, che può essere ritirato gratuitamente in laboratorio.

Il contenitore va conservato al fresco per tutto il tempo della raccolta.

Per eseguire correttamente la raccolta occorre:

1. Scartare la prima urina del mattino.
2. Raccogliere, da questo momento in poi, tutte le urine che saranno prodotte nelle successive 24 ore, inclusa la prima del giorno seguente l'inizio della raccolta.

N.B: Per la determinazione di ACIDO

VANILMANDELICO e CATECOLAMINE è necessario che, durante la raccolta, il paziente non assuma: aspirina, banana, dolci alla vaniglia, the, cioccolato, psicofarmaci.

UROCOLTURA

Il recipiente da usare per la raccolta del campione di urine deve essere sterile e può essere ritirato in accettazione o acquistato in farmacia.

E' consigliabile raccogliere la prima urina del mattino, subito dopo essersi alzati dal letto. Seguire attentamente le seguenti prescrizioni.

1. Eseguire un'accurata pulizia locale;
2. Scartare il primo getto di urina;
3. Raccogliere l'urina direttamente nel contenitore avendo cura di non toccare le pareti interne;
4. Chiudere bene il contenitore e portarlo entro le ore 10 in laboratorio.

Specificare se la donna è in gravidanza o se le urine sono state raccolte mediante catetere.

ESAME FECI

Il contenitore può essere ritirato gratuitamente in laboratorio o acquistato in farmacia.

FECI: ESAME PER L'ESAME COLTURALE (copro coltura) E LA RICERCA DEI PARASSITI

Raccogliere una piccola quantità di feci e porla in un contenitore pulito (esistono contenitori muniti di paletta). Il campione non deve essere contaminato da urina. È opportuno che il paziente non sia sottoposto a terapia antibatterica o antielmintica.

FECI: ESAME PER LA RICERCA DEL SANGUE OCCULTO

Raccogliere una piccola quantità di feci e porla in un contenitore pulito (esistono contenitori muniti di paletta). Il campione non deve essere contaminato da urina. L'esame è specifico per il sangue umano, quindi non è

necessaria alcuna dieta mentre è opportuno evitare il periodo mestruale.